

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУН ГНЦ ПМБ

М.В. Храмов

«28» июня 2023 г.



Генеральный директор
ООО «Дезон»

А. В. Лёвин

«28» июня 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 37-23
по применению средства дезинфицирующего
(бесспиртовой антисептик) «ДЕЗОН- аква»
(ООО «Дезон», Россия)

**Москва
2023 г.**

ИНСТРУКЦИЯ № 37-23
по применению средства дезинфицирующего (бесспиртовой антисептик)
«ДЕЗОН-аква» (ООО «Дезон», Россия)

Инструкция разработана: ФБУН ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии; «Институт вирусологии им. Д.И.Ивановского» ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России; ООО «Дезон»

Авторы: Кузин В.В. (ФБУН ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии), Носик Д.Н. (Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России), А. В. Лёвин (ООО «Дезон»).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство дезинфицирующее (бесспиртовой антисептик) «ДЕЗОН-аква» выпускается в виде готовой к применению жидкости, в зависимости от насадки упаковки - в виде пенки, спрея, а также в виде пропитанных средством салфеток.

В качестве действующих веществ средство содержит: алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид (суммарно)– 0,5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – 0,7%, а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, в том числе Д-пантенол. Показатель концентрации водородных ионов (pH) в средстве $6,0 \pm 1,0$.

Средство в виде готовой к применению жидкости, пропиточный раствор представляет собой прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жидкость со слабым специфическим запахом или запахом отдушки.

Для обработки инъекционного, операционного поля, локтевых сгибов доноров средство выпускается без увлажняющих и ухаживающих за кожей компонентов и без отдушки.

Для обозначения границ инъекционного и операционного поля средство так же может применяться окрашенным в интенсивный цвет, соответствующий цвету применяемого красителя.

Средство «ДЕЗОН-аква» в виде готовых к применению салфеток «Дезинфицирующие салфетки «ДЕЗОН-аква» представляет собой готовые к применению салфетки из белого нетканого материала различных размеров и разной плотности, равномерно пропитанные дезинфицирующим средством «ДЕЗОН-аква».

Салфетки выпускают трех видов:

- в виде перфорированной ленты до 750 салфеток, сформированной в рулон и упакованной в герметичную упаковку – емкость-диспенсер (банки, ведра) соответствующего размера из плотного полимерного материала с двойными зажимными крышками (внутренняя крышка с функциональной прорезью для извлечения одной салфетки); для контроля первого вскрытия упаковка с салфетками запаяна сверху по окружности полимерной пленкой.

Сменный блок представляет собой перфорированную ленту из салфеток, сформированных в рулон и упакованных в пленку из мягких полимерных материалов.

- в пакетах из полимерных материалов до 450 салфеток в пакете с герметизирующим клапаном;

- в индивидуальных герметичных пакетах из трехслойного композиционного материала (полиэтилен, фольга, бумага) по 1 салфетке (упаковка “саше”).

Салфетки изготовлены из высококачественного, экологически безопасного материала. Обладают высокой прочностью, легко отрываются по линии перфорации, при использовании не рвутся, не оставляют ворса на обрабатываемой поверхности, обладают высокими влагоудерживающими свойствами.

Средство «ДЕЗОН-аква» может использоваться в качестве пропиточного раствора для сухих салфеток, помещенных в диспенсерную систему.

Срок годности средства в виде жидкости и в виде салфеток – 6 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения. После вскрытия защитной пленки срок годности салфеток, упакованных в банку и пакет – 6 месяцев при соблюдении условий хранения и применения. При высыхании салфеток их использование запрещается.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), внутрибольничных инфекций (ВБИ) – тестировано на *Pseudomonas aeruginosa*, кишечных инфекций - *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhimurium*, метициллин-резистентного стафилококка и ванкомицин-резистентного энтерококка; вирулицидной активностью (включая рино-, коро-, рото-, адено-вирусы, коронавирусы, вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов (в т. ч. гепатита А, В, С, Д), полиомиелита, ВИЧ, вирусов гриппа и парагриппа человека и др. возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, вирусов «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), вирусов герпеса, кори, цитомегаловирусной инфекции, вируса Эбола, и т. д.), легионеллеза; фунгицидной активностью в отношении грибов рода *Candida*, *Trichophyton*, плесневых грибов, в т.ч. *Aspergillus brasiliensis*, *Mucor spp*; возбудителей особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии).

Средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 5 часов.

Обладает хорошими моющими и дезодорирующими свойствами, не оставляет следов на обработанной поверхности.

Не требует смывания после обработки.

1.3. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу, согласно ГОСТ 12.1.007-76, средство относится к 4 классу мало опасных веществ. При парентеральном введении (в брюшную полость) относится к 5 классу практически нетоксичных веществ (по классификации К.К. Сидорова). Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсibiliзирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. Средство обладает умеренно выраженным раздражающим действием на оболочки глаз. При ингаляционном воздействии паров в насыщающих концентрациях средство относится к 4 классу мало опасных дезинфицирующих средств по степени летучести. Согласно классификации степени ингаляционной опасности дезинфицирующих средств по зоне острого и подострого биоцидного действия средство относится к 4 классу мало опасных веществ.

Нанесение средства на скарифицированную кожу не осложняет заживления искусственно нанесенных ран.

ПДК в воздухе рабочей зоны для:

- ЧАС - 1,0 мг/м³ (аэрозоль, 2 класс опасности);

- полигексаметиленгуанидина гидрохлорида – 2,0 мг/м³ (аэрозоль, 3 класс опасности).

Обработку поверхностей можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии людей.

1.4. Средство дезинфицирующее «ДЕЗОН-аква» предназначено для применения в медицинских организациях (МО) и лечебно-профилактических организациях (ЛПО), включая хирургические, терапевтические, офтальмологические, онкологические, службы родовспоможения, детские (в том числе неонатологические и палаты новорожденных), приемные отделения, стоматологические клиники, детские и взрослые поликлиники, клинические, биохимические, серологические, ПЦР и др. профильные диагностические лаборатории различных подчинений, эндоскопические и колоноскопические отделения, кожно-венерологические и инфекционные отделения, диспансеры, отделения физиотерапевтического профиля, отделения интенсивной терапии и реанимации, травматологии, ожоговые центры, центры по трансплантации органов, станции и отделения переливания крови, донорские пункты, станции и машины скорой и неотложной медицинской помощи, патологоанатомические отделения, отделения судмедэкспертизы, санпропускники; санаторно-курортные учреждения; учреждения соцобеспечения (хосписы, дома-интернаты для инвалидов и лиц пожилого возраста), объекты социальной сферы (пансионаты, дома отдыха, интернаты и др.); объекты массового скопления людей (вокзалы, аэропорты, метрополитен, железнодорожный транспорт, городской наземный транспорт, культурно-развлекательные, торговые, оздоровительные, спортивные, административные объекты); предприятия коммунально-бытового обслуживания населения (парикмахерские, косметические салоны, массажные кабинеты, маникюрно-педикюрные кабинеты, солярии,

плавательные бассейны, общественные туалеты, фитнес–центры, бани, сауны, гостиницы, общежития и др.); учреждения образования, культуры, отдыха, спорта; объекты МО, МЧС, Минобороны, ГО и др. ведомств, воинские и пенитенциарные учреждения, учреждения, оказывающие ритуальные услуги, детские дошкольные, школьные и др. общеобразовательные и оздоровительные учреждения (детские сады, школы, специальные (коррекционные) учреждения, учреждения для детей-сирот, средние и высшие учебные заведения, детские оздоровительные учреждения и учреждения отдыха); автотранспорт для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья, санитарный, специальный автотранспорт; предприятия общественного питания, продовольственной торговли, промышленных рынков, пищевой промышленности; потребительские рынки; учреждения фармацевтической и биотехнологической, микробиологической, парфюмерно-косметической промышленности, аптеки, аптечные заведения, ветеринарные объекты, птицеводческие, животноводческие, звероводческие хозяйства, зоны чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; инфекционные очаги.

в качестве кожного антисептика для:

-для гигиенической обработки рук в вышеперечисленных учреждениях:

- перед непосредственным контактом с пациентом;
- после контакта с неповрежденной кожей пациента (например, при измерении пульса или артериального давления);
- после контакта с секретами или экскретами организма, слизистыми оболочками, повязками;
- после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами;
- перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом;
- после каждого контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием;
- после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от пациента;

- перед надеванием медицинских перчаток и после их снятия;
-обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер и других лиц, участвующих в проведении операций (в том числе стоматологических клиниках), а также при приеме родов в родильных домах, катетеризации магистральных сосудов (за исключением объектов, потенциально контаминированных микобактериями туберкулеза и очагов туберкулезной инфекции);

- обработки кожи инъекционного поля пациентов, в том числе при проведении прививок;

-обработки локтевых сгибов доноров в МО И ЛПО, на станциях переливания и забора крови и др.;

-обработки кожи операционного поля, в том числе при катетеризации и пункции суставов и органов (в том числе лечебных и диагностических пункций, катетеризаций периферических и центральных сосудов, спинномозговых функций, катетеризаций эпидурального пространства, пункций суставов), проведением проколов, рассечений, биопсии в МО И ЛПО, медицинских кабинетах различных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов, и др.), санаторно-курортных учреждениях, пенитенциарных и других учреждениях, а также в условиях транспортировки в машинах скорой помощи и при чрезвычайных ситуациях;

-для частичной санитарной обработки кожных покровов (в том числе тело, ступни ног) работников и пациентов медицинских организаций, включая лежачих больных, в отделениях гериатрического, онкологического профиля, паллиативной помощи, учреждений соцобеспечения (хосписы, дома-интернаты для инвалидов и лиц пожилого возраста);

- медицинских перчаток из различных материалов, надетых на руки медицинского персонала в микробиологических лабораториях при бактериальных (исключая туберкулёз), вирусных и грибковых инфекциях, в том числе при попадании на перчатки инфицированного материала, при сборе медицинских отходов, при проведении инъекций, при загрязнении перчаток выделениями или кровью во избежание загрязнения рук перед их снятием,

дезинфекцией и последующей утилизацией, а также работников предприятий, выпускающих стерильную продукцию, где требуется соблюдение асептических условий;

- для использования **населением в быту**, в том числе на различных видах транспорта;
- использование средства **детьми** в детских дошкольных, школьных и др. общеобразовательных и оздоровительных учреждениях (детские сады, школы, специальные (коррекционные) учреждения, учреждения для детей-сирот, средние и высшие учебные заведения, детские оздоровительные учреждения и учреждения отдыха) возможно только под присмотром взрослых.

для экстренной дезинфекции и очистки небольших по площади твердых поверхностей в помещениях, в том числе загрязненных биологическими выделениями, труднодоступных поверхностей:

- **предметов обстановки и оборудования** на объектах различного назначения (дверные и оконные ручки, выключатели, жёсткой мебели, в т. ч. подголовников, подлокотников, поручней, столов (в т. ч. обеденные, разделочные, операционные, процедурные, манипуляционные, пеленальные, родильные, массажные), гинекологических и стоматологических кресел и установок, кроватей, реанимационных матрацев, носилок, каталок и др. жёсткой мебели;

- **дезинфекции санитарно-технического оборудования** (ручки кранов и сливных бачков, сидения унитазов в туалетных комнатах, туалетных полочек, тумбочек, поверхностей в кабинах автономных туалетов, СПА оборудования (в т.ч. фаянсовых, чугунных и акриловых ванн, грязевых, гидромассажных, гальванических ванн, оборудования для бальнеотерапии, СПА-капсул, душевых кабин) и др.);

- **наружных поверхностей медицинских приборов и аппаратов**, не предназначенных для инвазивного вмешательства (физиотерапевтическое, диагностическое, лечебное оборудование и материалы к ним, стоматологическое оборудование, датчики аппаратов УЗИ, рентген-аппаратов, включая маммографы, МРТ, аппараты ингаляционного наркоза, оборудование для анестезии и искусственной вентиляции легких, оборудование для гемодиализа, кардиоэлектроды – клеммы, насадки, клипсы и др.); фонендоскопов и стетоскопов, тонометров, в том числе для внутренней стороны манжеты тонометра, глюкометров, оптических приборов и оборудования; соляриев и ламп для соляриев, бактерицидных ламп, осветительной аппаратуры;

- **наружных поверхностей медицинского оборудования** в клинических, микробиологических и других лабораториях (в том числе для очистки предметных стекол для микроскопии от иммерсионного масла);

- **поверхностей запаянных стеклянных ампул (флаконов);**

- **дезинфекции поверхностей медицинских изделий и медицинской техники**, которые не соприкасаются непосредственно со слизистой пациента или конструктивные особенности которых не позволяют применять способ погружения (стоматологические наконечники, переходники от турбинного шланга к наконечникам, микромотор к механическим наконечникам, наконечники к скелеру для снятия зубных отложений, световоды светоотверждающих ламп и др.), в том числе стоматологических оттисков, заготовок зубных протезов и т.д., стоматологического оборудования, нуждающегося в быстрой дезинфекции способом протирания или орошения, стоматологических установок, в т. ч. плевательниц в лечебно-профилактических учреждениях;

- **поверхностей оборудования и инструментов парикмахерских**, косметических и массажных салонов, соляриев, маникюрно-педикюрных кабинетов и т.д. (инструменты маникюрные, педикюрные, для косметических процедур, для стрижки, ванны для ног и ванночки для рук, электроды к косметическому оборудованию и приборы и т. д.);

- **предметов ухода за больными** (термометры, судна, грелки, подкладные клеенки, фартуки, чехлы матрасов, пузыри для льда, подкладные круги и др.), **игрушек, спортивного инвентаря, средств личной гигиены;**

- **наружных и внутренних поверхностей кондиционеров и систем вентиляции воздуха**, секций центральных и бытовых кондиционеров, радиаторных решеток, насадок и накопителей конденсата систем вентиляции и кондиционирования;

- дезинфекции воздуха в помещениях;
- дезинфекции средств индивидуальной защиты персонала;
- дезинфекции резиновых, пластиковых и полипропиленовых ковриков;
- дезинфекции внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний и удаления неприятных запахов;
- дезинфекции столовой посуды и столовых приборов без остатков пищи (из пищевого пластика) перед их утилизацией;
- обработки скорлупы яиц;
- наружных поверхностей и оборудования санитарного транспорта после транспортировки инфекционного больного; мобильных госпиталей; транспорта служб ГО и ЧС;
- экстренной дезинфекции и очистки небольших по площади твердых поверхностей, в том числе труднодоступных в производственных, складских, вспомогательных, санитарных, бытовых и подсобных помещениях, выложенных кафелем стен и напольных покрытий, технологического оборудования (упаковочное оборудование, вакуумное оборудование, линии розлива, упаковки, расфасовки весы, слайсеры и т.д.), его частей, аппаратуры, инвентаря (доски разделочные, ножи, мясорубки и др.) и посуды, тары (ёмкостей, поддонов, ящиков и т.д.), на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (молочная, мясная, рыбная, птицеперерабатывающая, хлебобулочная, кондитерская, пивобезалкогольная, винодельческая, ликёрововодочная, плодовоовощная, консервная, по производству дрожжей, детского питания, общественного питания, соков, напитков), торговли (в том числе магазинах, торговых центрах, рынках и т.д.), аграрного сектора;
- наружных поверхностей телефонных аппаратов, комплектующих устройств компьютеров (мониторы, компьютерные клавиатуры, микрофоны, принтеры) и другой офисной техники, счетчиков банкнот, детекторов валют, архивных шкафов и стеллажей, осветительной аппаратуры, жалюзи и т.д.;
- холодильных камер, холодильных установок и холодильных помещений на предприятиях и в учреждениях любого профиля, в т. ч. медицинских;
- поверхностей и объектов в учреждениях, оказывающих ритуальные услуги;
- на объектах МЧС, ФСБ, ФСО, Минобороны, личного состава войск и формирований ГО и др., воинских и пенитенциарных учреждений;
- на объектах транспортной системы, на всех видах общественного транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы, поезда дальнего следования, вагоны - рестораны и буфеты, электрички, пригородные экспрессы, вагонов пассажирских составов различного типа, вагоны метрополитена, вокзалы, станции и т.д.), авиации, речного и морского флота; кабин и отсеков воздушных судов гражданской авиации;
- на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- поверхностей, пораженных плесневыми грибами;
- поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов и аппаратов в очагах инфекционных заболеваний, в т. ч. вызванных возбудителями особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии);
- для профессионального применения персоналом учреждений и клининговых компаний, населением в быту;
- для пропитывания сухих салфеток для диспенсерной системы на месте, согласно инструкции.

1.5 Салфетки площадью менее 100 см² предназначены для:

- обработки кожи инъекционного поля пациентов, в том числе при проведении прививок;
- обработки локтевых сгибов доноров в ЛПУ, на станциях переливания крови и др.;
- обработки кожи операционного поля взрослых пациентов, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов (в том числе лечебных и диагностических пункций, катетеризаций периферических и центральных сосудов, спинномозговых функций, катетеризаций эпидурального пространства, пункций суставов), проведением проколов,

рассечений, биопсии.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Средство «ДЕЗОН-аква» в форме готовой к применению жидкости используется при помощи различных дозирующих устройств, способных выдавать заданное количество жидкости, методом орошения (с помощью распылительных насадок и пенообразующих насадок), методом протирания (с помощью ватных или марлевых тампонов, а также пропитанных средством сухих салфеток из диспенсерной системы).

2.2. Средство в виде салфеток «Дезинфицирующие салфетки «ДЕЗОН-аква», упакованных в емкость-диспенсер (полимерные банки или ведра), необходимо начинать использовать из центра рулона. Для предотвращения высыхания салфеток, банку следует сразу же закрыть крышкой после извлечения очередной салфетки.

Если в процессе использования крайняя салфетка высохла, ее необходимо выбросить и использовать следующую

Салфетки, упакованные в индивидуальную упаковку: перед применением вскрыть упаковку, извлечь, развернуть салфетку и сразу провести обработку.

Салфетки площадью менее 100 см² в индивидуальной упаковке предназначены для обработки кожи инъекционного и операционного поля, локтевых сгибов доноров.

2.3. Гигиеническая обработка рук: на сухие руки (без предварительного мытья водой и мылом) наносят не менее 2 мл средства и втирают его в кожу, добиваясь равномерного смачивания и тщательной обработки кончиков пальцев, кожи вокруг ногтей, между пальцами или протирают одной влажной дезинфицирующей салфеткой «ДЕЗОН-аква», извлеченной из упаковки или салфеткой из диспенсерной системы, обильно смоченной средством.

Время дезинфекционной выдержки 20 секунд – до полного высыхания кожных покровов.

Время обработки при вирусных инфекциях - 1 мин.

2.4. Обработка рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушеров и других лиц, участвующих в проведении операций, родовспоможении и т.п. (за исключением объектов, потенциально контаминированных микобактериями туберкулеза и очагов туберкулезной инфекции): перед применением средства кисти рук и предплечья предварительно тщательно моют теплой проточной водой с мылом (предпочтительно жидким) в течение 2-х минут, затем высушивают стерильной марлевой салфеткой.

Далее на кисти рук наносят дважды по 2-3 мл средства, равномерно распределяя и втирая его в кожу обеих кистей рук и предплечий до полного высыхания, обращая внимание на обработку кончиков пальцев, кожи вокруг ногтей и между пальцами обеих рук. Общее время обработки составляет 2 мин.

Стерильные перчатки надевают после полного высыхания средства.

Средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 5 часов

2.5. Обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов: кожу двукратно протирают отдельными стерильными марлевыми тампонами, салфетками из диспенсерной системы, обильно смоченными средством или двумя разными готовыми дезинфицирующими салфетками «ДЕЗОН-аква; время выдержки после окончания обработки – 1 мин.; накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

Для обозначения границ операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров применяется окрашенный в интенсивный цвет антисептик «ДЕЗОН-аква».

После проведения манипуляций при необходимости окраску кожи снимают путем промывания окрашенного участка водой с мылом.

В случае окрашивания белья после использования средства окраску снимают путем замачивания белья в растворе синтетических моющих средств или проводят предварительную стирку в стиральной машине с последующей основной стиркой. В случае сильного загрязнения замачивание белья проводят с использованием отбеливающих средств.

2.6. Обработка инъекционного поля: обработку проводят способом орошения кожи в месте инъекции с использованием распылительной насадки до полного увлажнения или

протирают стерильным ватным тампоном или салфеткой из диспенсерной системы, обильно смоченными средством, или готовой дезинфицирующей салфеткой «ДЕЗОН-аква». Время выдержки после окончания обработки – не менее 20 секунд.

2.7. Санитарная обработка кожных покровов (в т. ч. тело, ступни ног): обработку проводят способом орошения кожи с использованием распылительной насадки до полного увлажнения или протирают ватным тампоном или салфеткой из диспенсерной системы, обильно смоченными средством, или готовой дезинфицирующей салфеткой «ДЕЗОН-аква». Время обработки – не менее 1 мин

2.8. Обработка перчаток, надетых на руки персонала: для обеззараживания поверхности перчаток, надетых на руки персонала, в сжатую ладонь руки в перчатке наносят 2,5 мл средства. Затем равномерно распределяют порцию средства по поверхности перчаток на обеих руках, совершая такие же движения, как при обработке рук антисептиком. Или обрабатывают стерильным ватным или марлевым тампоном или салфеткой из диспенсерной системы, обильно смоченными средством, или готовой влажной дезинфицирующей салфеткой «ДЕЗОН-аква». Время дезинфекционной выдержки - не менее 1 минуты при бактериальных инфекциях, не менее 3 минут при грибковых (Кандида, Трихофитон), вирусных инфекциях. При загрязнении перчаток выделениями, кровью и т.п. во избежание загрязнения рук в процессе их снятия, необходимо снять загрязнения ватным тампоном или салфеткой, обильно смоченными средством, а затем провести обработку как указано выше.

После обработки перчаток средством их необходимо снять с рук и направить на утилизацию, а затем провести гигиеническую обработку рук средством «ДЕЗОН-аква».

2.9. Дезинфекция обуви: внутреннюю поверхность обуви протирают разными дезинфицирующими салфетками «ДЕЗОН-аква» или салфетками из диспенсерной системы, обильно смоченными средством, используя на одну пару обуви на каждую обработку две салфетки или орошают из распылителя до полного увлажнения. Время дезинфекционной выдержки 3 минуты.

2.10. Дезинфекция резиновых, пластиковых и полипропиленовых ковров: имеющие ровную поверхность, равномерно протирают готовыми влажными дезинфицирующими салфетками «ДЕЗОН-аква» или салфетками из диспенсерной системы, обильно смоченными средством, или орошают из распылителя до полного увлажнения. Время дезинфекционной выдержки 3 минуты.

2.11. Дезинфекция небольших по площади поверхностей в помещениях, не загрязненных биологическими выделениями, труднодоступных поверхностей, поверхностей приборов, аппаратов, медицинского оборудования; поверхностей на санитарном транспорте проводится способом протирания (использование салфеток) или способом орошения (при использовании флаконов с насадками-распылителями или пенообразующими насадками) по режимам соответствующей инфекции (таблица 1).

При проведении дезинфекции **способом орошения** поверхности равномерно увлажняют средством до полного смачивания с помощью распылительной насадки с расстояния 30-50 см. Норма расхода средства – от 30 мл/м² обрабатываемой поверхности. Максимально допустимая для обработки площадь должна составлять не более 1/10 от общей площади помещения.

При проведении дезинфекции **методом протирания** используют готовые дезинфицирующие салфетки «ДЕЗОН-аква» или салфетки из диспенсерной системы, обильно пропитанные средством. Одной салфеткой в зависимости от её размера и плотности можно однократно обработать поверхность площадью не более 2 м². Для дезинфекции больших по площади поверхностей следует использовать несколько салфеток.

Поверхности, подлежащие дезинфекции, должны быть увлажнены средством полностью и равномерно по всей площади. Поверхности можно использовать после полного высыхания средства. В случае необходимости поверхности можно протереть сухой салфеткой после окончания времени дезинфекционной выдержки, не дожидаясь высыхания.

Дезинфекцию поверхностей можно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания. После обработки средством смывание с поверхностей не требуется. Проветривание помещения после обработки не требуется. В некоторых случаях (куветы, стоматологические наконечники, игрушки, объекты, соприкасающихся с пищевыми

продуктами), обработанные поверхности протирают пропитанными водой салфетками (промывают водой) и вытирают насухо.

2.12. При наличии биологических загрязнений (органических и др.) на обрабатываемых поверхностях, необходимо одной салфеткой удалить загрязнение, а другой провести повторную обработку по режимам соответствующей инфекции (таблица 1). Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнейшей утилизации.

2.13. В спортивно-оздоровительных учреждениях (спортивные комплексы, фитнес-залы, бассейны, бани, аквапарки), на предприятиях сферы коммунально-бытового обслуживания (парикмахерские, косметические салоны, массажные кабинеты, солярии) дезинфекцию объектов проводят в соответствии с режимами, эффективными в отношении дерматофитий (таблица 1).

2.14. Профилактическую дезинфекцию поверхностей в гостиницах, общежитиях, продовольственных и промышленных рынках, учреждениях культуры, отдыха, спорта, кинотеатрах, учреждениях социального обслуживания проводят по режимам, представленным в таблице 3.

2.15. Обработка поверхностей медицинских изделий, медицинской техники, не предназначенных для инвазивного вмешательства и не контактирующих непосредственно со слизистой пациентов или конструктивные особенности которых не позволяют применять способ погружения. Поверхности медицинских изделий и медицинской техники двукратно протирают разными дезинфицирующими салфетками «ДЕЗОН-аква» или салфетками из диспенсерной системы, пропитанными средством из расчета 3 мл средства на каждые 100 см² площади салфеток.

Режимы дезинфекции представлены в таблице 2. Так же следует учитывать рекомендации фирмы-изготовителя каждого конкретного изделия.

2.16. Поверхности датчиков диагностического оборудования (УЗ-датчики, кардиоэлектроды и пр.), глюкометры, фонендоскопы и прочие изделия, контактирующие с кожными покровами и допускающие обеззараживания способами протирания, в случае наличия видимых загрязнений или остатков геля обрабатывают в 2 этапа с проведением предварительной очистки и дезинфекции. Обработку корпусов глюкометров и ручек для прокалывания проводят способом протирания салфетками в два этапа с проведением предварительной очистки.

2.17. Дезинфекцию стоматологических наконечников и других стоматологических инструментов для неинвазивных манипуляций проводят после каждого пациента путем двухэтапной обработки с проведением предварительной очистки и дезинфекции. После дезинфекционной выдержки остатки средства удаляют тканевыми салфетками, обильно пропитанными питьевой водой.

2.18. Обработка запаянных стеклянных ампул (флаконов) перед проведением инъекций: верхнюю треть запаянной ампулы протирают стерильным ватным тампоном или салфетками из диспенсерной системы, обильно пропитанными средством, или влажными салфетками «ДЕЗОН-аква». Время выдержки после окончания обработки – не менее 20 секунд.

2.19. Предварительную очистку наружной поверхности эндоскопов от биологических загрязнений, наружной поверхности шлангов эндоскопов и колоноскопов проводят сразу после завершения эндоскопической манипуляции. Рабочую поверхность эндоскопа и колоноскопа, имеющую видимые биологические загрязнения, обрабатывают по направлению от блока управления к дистальному концу до удаления всех видимых загрязнений с поверхности с помощью влажной салфетки. Дальнейшую обработку эндоскопа проводят согласно требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Использование средства разрешается для обработки только тех эндоскопов, производитель которых допускает применение для этих целей средств, содержащих указанные в составе действующие вещества.

2.20. Дезинфекция куветов для новорожденных, в т.ч. недоношенных, детей. Поверхности тщательно протирают дезинфицирующими салфетками «ДЕЗОН-аква».

При обработке необходимо учитывать рекомендации производителя куветов.

Профилактическую дезинфекцию наружных поверхностей куветов проводят по бактериальному режиму, внутренних поверхностей и приспособлений – по режиму, рекомендованному при вирусных и грибковых инфекциях.

После дезинфекции остатки средства удаляют многократным протиранием стерильными салфетками или стерильной пленкой, обильно пропитанными стерильной водой. Затем поверхности вытирают насухо стерильной пленкой.

2.21. Обработку поверхностей парикмахерских инструментов и оборудования проводят способом орошения или протирания по режимам, рекомендованным при дерматофитиях (таблица 1).

2.22. Предметы ухода за больными из непористых, гладких материалов (подкладные клеенки, грелки и т.п.), **предметы личной гигиены, игрушки** обильно орошают средством или протирают влажной салфеткой по режимам, указанным в таблице 1. По окончании дезинфекционной выдержки предметы, соприкасающиеся со слизистыми оболочками, отмывают в течение 2 минут под проточной питьевой водой.

2.23. Поверхности санитарно-технического оборудования орошают средством или протирают влажной салфеткой до полного смачивания поверхностей. Обработку проводят двукратно с интервалом 3 минуты. По окончании дезинфекционной выдержки поверхности промывают проточной водой.

2.24. Многоразовые емкости и контейнеры, предназначенные для сбора отходов класса А, после опорожнения подлежат мойке и двукратной обработке по режимам бактериальных инфекций (кроме туберкулеза). Многоразовые контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов класса Б и В обрабатывают в 2 этапа с проведением предварительной очистки и дезинфекции по режимам соответствующей инфекции.

2.25. Профилактическую дезинфекцию оборудования и поверхностей машин скорой помощи, служб ГО и ЧС, санитарного транспорта, общественного транспорта, транспорта для перевозки пищевых продуктов проводят по режимам, эффективным в отношении бактериальных инфекций, транспорт для перевозки инфекционных больных – по режимам соответствующей инфекции.

После дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов, обработанные поверхности промывают водой и вытирают насухо.

2.26. Дезинфекцию объектов, потенциально опасных в отношении распространения легионеллезной инфекции, проводят в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", МУ 3.1.2.2412-08 «Эпидемиологический надзор за легионеллезной инфекцией». Обеззараживанию подвергают различные поверхности, в том числе наружные и внутренние поверхности кондиционеров, секции центральных и бытовых кондиционеров, радиаторные решетки, насадки и накопители конденсата.

2.27. Для борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначала очищают от плесени, просушивают, затем двукратно, с интервалом 5 минут, протирают влажной салфеткой или орошают средством. Время дезинфекционной выдержки после обработки 10 минут. Для предотвращения роста плесени в дальнейшем обработку повторяют через 1 месяц.

2.28. Дезинфекция столовой посуды и столовых приборов без остатков пищи (из пищевого пластика) перед их утилизацией проводится способом протирания (использование готовых дезинфицирующих салфеток «ДЕЗОН-аква» или салфеток из диспенсерной системы, пропитанных средством). Время выдержки после обработки не менее 1 мин.

2.29. Дезинфекция поверхности скорлупы пищевых яиц.

Обеззараживание скорлупы пищевых яиц, используемых для приготовления блюд, осуществляют в отведенном месте в специальных промаркированных емкостях в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и обороту способности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

К обработке допускаются только яйца, проверенные на отсутствие повреждений скорлупы.

Дезинфекция яиц без видимых загрязнений скорлупы:

Предварительно овоскопированные и переложенные в решетчатые ящики, пластмассовые прокладки или другую тару яйца обрабатывают в двухсекционной ванне в следующем порядке.

В первой секции проводится замачивание в средстве в течение 1 мин. при температуре раствора 18-30 °С, после чего яйца направляют во вторую секцию для ополаскивания. Во второй секции яйца ополаскивают проточной водой с температурой 18-30 °С с помощью щеток до полного смывания следов дезинфектанта (не менее 1 мин).

Раствор средства для дезинфекции скорлупы яиц можно использовать многократно. При загрязнении раствора (помутнение, появление хлопьев, изменение цвета) его следует заменить.

Дезинфекция яиц с загрязненной скорлупой:

Для совмещения мойки и дезинфекции в одном этапе яйца с загрязненной скорлупой устанавливают в ящиках, пластмассовых прокладках или другой таре на решетки в ванну для замачивания в средстве при температуре 18-30 °С на 1 мин. По истечении времени экспозиции яйца очищают щетками в том же растворе, после чего направляют во вторую секцию для ополаскивания, где яйца ополаскивают проточной водой с температурой 18-30 °С до полного смывания следов дезинфектанта (не менее 1 мин).

При проведении совмещенной мойки и дезинфекции поверхности скорлупы яиц рабочий раствор используют однократно.

Обработанные яйца ставят на решетки стеллажи на 15-20 мин для стекания воды и подсушивания

Чистое яйцо выкладывают в чистую промаркированную посуду.

2.30. Экстренную очистку и дезинфекцию поверхностей в помещениях, стеллажей, инвентаря, тары на плодоовощных базах, складах, овоще- и фруктохранилищах для предупреждения развития гнилостных бактерий проводят после их механической очистки. Время экспозиции после обработки средством «ДЕЗОН-аква» 0,5 мин.

После экспозиции поверхности, непосредственно контактирующие с пищевыми продуктами, дважды протирают салфеткой, обильно пропитанной проточной водой. Мелкий инвентарь отмывают от остатков средства проточной водой. Смывание рабочих растворов средства с поверхностей, не контактирующих с пищей (пол, стены, двери, и пр.) не требуется.

2.31. Дезинфекцию воздуха проводят с помощью соответствующих технических установок способом распыления или аэрозолирования рабочего раствора средства по режимам соответствующей инфекции, при норме расхода 10 мл/м³. Предварительно проводят дезинфекцию поверхностей, помещение герметизируют: закрывают окна и двери, отключают приточно-вытяжную вентиляцию. По истечении дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора при необходимости удаляют с поверхностей сухой ветошью, а помещения проветривают в течение 10-15 мин.

2.32. Дезинфекцию поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов, медицинских инструментов в очагах чумы, холеры, туляремии проводят по режимам при особо опасных инфекциях, представленным в таблицах 1, 2 способом погружения или обильного орошения.

2.33. Применение средства «ДЕЗОН-аква» в виде пенки.

2.33.1 Гигиеническая обработка рук: на сухие кисти рук (без предварительного мытья водой и мылом) наносят 2-3 мл средства (4 дозы нажатия на пенообразующий дозатор) и втирают в кожу не менее 20 секунд, обращая особое внимание на тщательность обработки ногтевых лож и межпальцевых пространств.

Для профилактики вирусных инфекций время обработки - 1 мин.

2.33.2 Обработка рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушеров и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов (за исключением объектов, потенциально контаминированных микобактериями туберкулеза и очагов туберкулезной инфекции): перед применением средства кисти рук и предплечья предварительно тщательно моют теплой проточной водой с мылом (предпочтительно жидким) в течение 2-х минут, затем высушивают стерильной марлевой салфеткой.

Далее на кисти рук наносят дважды по 3 мл средства, равномерно распределяя и втирая его в кожу обеих кистей рук и предплечий до полного высыхания. Общее время обработки составляет 2 мин.

Стерильные перчатки надевают после полного высыхания средства.

Средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 5 часов.

2.33.3 Обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов: средство в виде пенки дважды наносят на кожу, равномерно распределяя образующуюся пену по обрабатываемому участку стерильным марлевым тампоном. Время выдержки после окончания обработки – 1 мин; накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

2.33.4 Обработка инъекционного поля: средство в виде пенки наносят на кожу в месте инъекции и втирают его в кожу стерильным ватным тампоном. Время выдержки после окончания обработки – не менее 20 сек.

2.33.5 Санитарная обработка кожных покровов (в т.ч. тело, ступни ног): средство наносят на отдельные участки кожных покровов (кроме волосистой части головы) равномерно распределяя образующуюся пену по участку, подлежащему санитарной обработке, а затем обработанный участок протирают салфеткой. Время обработки – не менее 1 мин.

2.33.6. Обработка перчаток: для обеззараживания поверхности перчаток в сжатую ладонь руки в перчатке наносят дважды по 3 мл средства (4 дозы при нажатии на пенообразующий дозатор), совершая движения рук, которые выполняют при обработке кожи рук антисептиком. Время дезинфекционной выдержки - не менее 1 минуты при бактериальных инфекциях, не менее 3 минут при грибковых (Кандида, Трихофитон), вирусных инфекциях.

При загрязнении перчаток выделениями, кровью и т.п. во избежание загрязнения рук в процессе их снятия, необходимо снять загрязнения ватным тампоном или салфеткой, обильно смоченными средством, а затем провести обработку как указано выше.

После обработки средством перчатки необходимо снять с рук и направить на утилизацию, а затем провести гигиеническую обработку рук средством «ДЕЗОН-аква».

2.34. Применение средства «ДЕЗОН-аква» в качестве пропиточного раствора диспенсерной системы с сухими салфетками.

Для приготовления салфеток к использованию открывают крышку емкости-диспенсера с салфетками и равномерно, в верхнюю часть рулона аккуратно заливают средство «ДЕЗОН-аква» из расчета для салфеток плотностью $>30 \text{ г/м}^2$ 2,3 мл средства на каждые 100 см^2 площади салфеток в рулоне, для салфеток плотностью $< 30 \text{ г/м}^2$ 1,2 мл средства на каждые 100 см^2 площади салфеток в рулоне), крышку банки плотно закрывают и оставляют на 10-20 мин при комнатной температуре, за это время все салфетки должны быть полностью пропитаны дезинфицирующим средством. Количество средства должно быть достаточно, чтобы салфетки полностью пропитались, и раствор ещё оставался на дне емкости-диспенсера.

После этого заполнить и наклеить на емкость-диспенсер формуляр с указанием наименования средства «ДЕЗОН-аква», размера салфеток, количества салфеток в упаковке, дату пропитки салфеток, срок годности. По истечении 10-20 мин. крышку открыть, аккуратно продеть первую салфетку из середины рулона сквозь прорезь в крышке диспенсера и плотно закрыть крышку. Салфетки готовы к применению.

После извлечения необходимого количества салфеток емкость-диспенсер следует сразу же закрыть крышкой во избежание высыхания салфеток.

В процессе использования салфеток необходимо следить за количеством раствора в емкости-диспенсере, во избежание его высыхания.

Срок годности салфеток, пропитанных средством – 6 месяцев.

Использование влажных салфеток из диспенсерной системы в качестве кожного антисептика и для дезинфекции поверхностей аналогично использованию готовых влажных салфеток «ДЕЗОН-аква».

Таблица 1.

Режимы дезинфекции поверхностей из различных материалов дезинфицирующим средством «ДЕЗОН-аква» в виде жидкости и в виде салфеток «Дезинфицирующие

салфетки «ДЕЗОН-аква»

Объект обеззараживания	Вид инфекции	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, на санитарном транспорте, предметы обстановки, жёсткая мебель, наружные поверхности приборов, медицинского оборудования, парикмахерских инструментов и оборудования	Бактериальные	0,5	Орошение или протирание, использование салфеток
	Кандидозы	1	
	Дерматофитии	3	
	Вирусные	2	Протирание, использование салфеток
		3	Орошение
	Особо опасные инфекции (чума, холера, туляремия и пр.)	3	Погружение, обильное орошение
	Легионеллез	3	Орошение, протирание, использование салфеток
	Плесень	10	Двукратное орошение или двукратное протирание с интервалом 5 минут, использование салфеток
Поверхности в производственных помещениях, технологическое оборудование, разделочные столы, полки, инвентарь, холодильное оборудование поверхности на транспорте для перевозки пищевых продуктов	Бактериальные (кроме туберкулеза)	0,5	Орошение или протирание, использование салфеток
	Кандидозы	1	
	Вирусы	2	Протирание, использование салфеток
		3	Орошение
Санитарно-техническое оборудование (ручки кранов и сливных бачков, сидения унитазов в туалетных комнатах, туалетных полочек, тумбочек и др.)	Бактериальные, грибковые (кандидозы)	1	Двукратное орошение, двукратное протирание, использование салфеток
	Бактериальные, вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	3	
Предметы ухода за больными (судна, подкладные клеенки, термометры), предметы личной гигиены, игрушки из непористых материалов	Бактериальные, грибковые (кандидозы)	1	Двукратное орошение, двукратное протирание, использование салфеток
	Бактериальные, вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	3	

Таблица 2.

**Режимы дезинфекции поверхностей медицинских изделий, медицинской техники дезинфицирующим средством «ДЕЗОН-аква» в виде жидкости и в виде салфеток
«Дезинфицирующие салфетки «ДЕЗОН-аква»**

Объект обеззараживания	Вид инфекции	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
------------------------	--------------	----------------------------	------------------------

Поверхности медицинских изделий, медицинской техники, стоматологические инструменты, конструктивные особенности которых не позволяют применять способ погружения	Бактериальные, грибковые (кандидозы)	1	Двукратное протирание, использование салфеток
	Бактериальные, вирусные, грибковые (кандидозы)	2	
	Бактериальные, вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	3	Двукратное протирание, использование салфеток
	Особо опасные инфекции (чума, холера, туляремия)	3	Погружение, обильное орошение

Таблица 3

Режимы профилактической дезинфекции объектов дезинфицирующим средством «ДЕЗОН-аква» в виде жидкости и в виде салфеток

1. (гостиницы, общежития, продовольственные и промышленные рынки, учреждения культуры, отдыха, спорта, кинотеатры, дома инвалидов, престарелых и др.)

Объект обеззараживания	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Трубки телефонных аппаратов, дверные и оконные ручки, выключатели, журнальные и обеденные столики, подлокотники кресел, туалетные полочки, тумбочки, ручки кранов и сливных бачков, сидение унитаза	1	Орошение или протирание, использование салфеток

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Использовать только по назначению, для наружного применения. Запрещается принимать внутрь!

3.2. Избегать попадания средства в глаза, органы дыхания, на поврежденную кожу.

3.3. Обработку небольших по площади поверхностей в норме расхода можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов (больных). При превышении нормы расхода рекомендуется использовать универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки А и защитные очки, а обработку проводить в отсутствии пациентов.

3.4. Хранить отдельно от лекарственных средств, в местах недоступных для детей.

3.5. Средство должно применяться непосредственно из оригинальной упаковки изготовителя. Разбавление средства водой или другими растворителями, а также смешивание с другими средствами не допускается.

3.6. Не использовать по истечении срока годности.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 1-2 капли 30% раствор сульфацила натрия.

4.2. При появлении на коже раздражения, сыпи – прекратить применение средства, руки вымыть водой с мылом.

4.3. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Дать теплое питье. Рот и носоглотку прополоскать водой.

4.4. При попадании средства в желудок промыть желудок большим количеством воды, вызвать рвоту. Затем принять активированный уголь (10-12 измельченных таблеток).

4.5. При необходимости обратиться к врачу.

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Средство в виде жидкости выпускают в полимерных флаконах вместимостью от 0,05 дм³ до 1,5 дм³, в том числе с насадками-распылителями и дозирующими устройствами, с

пенообразующим дозатором; в канистрах из полимерных материалов вместимостью 1,5 – 5 дм³, а также во флаконах с евродозаторами вместимостью 1 дм³, канистрах полимерных вместимостью до 50 дм³, в бочках полиэтиленовых вместимостью до 200 дм³ с крышкой и прокладкой, обеспечивающими сохранность продукта, ёмкостях 1 м³ с крышкой и прокладкой.

Средство в виде салфеток выпускают:

- в виде перфорированной ленты до 750 салфеток, сформированной в рулон и упакованной в герметичную упаковку – ёмкость-диспенсер (банки, ведра) соответствующего размера из плотного полимерного материала с двойными зажимными крышками (внутренняя крышка с функциональной прорезью для извлечения одной салфетки); для контроля первого вскрытия упаковка с салфетками запаяна сверху по окружности полимерной пленкой.

Сменный блок представляет собой перфорированную ленту из салфеток, сформированных в рулон и упакованных в пленку из мягких полимерных материалов.

- в пакетах из полимерных материалов до 450 салфеток в пакете с герметизирующим клапаном;

- в индивидуальных герметичных пакетах из трехслойного композиционного материала (полиэтилен, фольга, бумага) по 1 салфетке (упаковка “саше”).

5.2 Средство транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары при температуре от минус 40°С до плюс 40°С..

При отрицательных температурах средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства.

5.3 При случайной утечке большого количества средство засыпать его сорбирующими материалами (песок, земля, опилки, стружка) собрать в ёмкость для последующей утилизации. Остатки средства смыть большим количеством воды. При уборке разлившегося продукта следует использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена; для защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60м с патроном марки А или промышленный противогаз.

В аварийных ситуациях при нарушении целостности упаковки собрать салфетки и отправить на утилизацию.

5.4 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. Перед утилизацией средство в виде жидкости разбавить большим количеством воды.

5.5 Средство хранят в крытых вентилируемых складских помещениях в плотно закрытой упаковке производителя отдельно от лекарственных средств, в местах, недоступных детям, при температуре от -40°С до + 40°С.

5.6 Срок годности средства - 6 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке изготовителя.

После вскрытия защитной пленки салфеток, упакованных в банку и пакет – 6 месяцев при соблюдении условий хранения и применения. При высыхании салфеток их использование запрещается.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1 Средство по показателям качества должно соответствовать требованиям и ТУ 20.20.14 -037-17643541-2022 нормам указанным в таблице 2, 3.

Таблица 1

Показатели качества средства дезинфицирующего «ДЕЗОН-аква» в виде жидкости

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ 20.20.14 -037-17643541-2022	Метод испытаний по ТУ 20.20.14 - 037-17643541-2022
1	Внешний вид	Прозрачная бесцветная или соответствующая цвету применяемого красителя жидкость. Допускается наличие слабой опалесценции и незначительного количества осадка.	п.5.1
2	Запах	Слабый специфический запах или запах применяемой отдушки	п.5.1
3	Показатель концентрации водородных ионов (рН)	$6,0 \pm 1,0$	п.5.2
4	Массовая доля аликилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (суммарно), %	$0,5 \pm 0,15$	п.5.3
5	Массовая доля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, %	$0,7 \pm 0,15$	п.5.4

Таблица 2

Показатели качества средства дезинфицирующего «ДЕЗОН-аква» в виде готовых к применению салфеток

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ 20.20.14 -037-17643541-2022	Метод испытаний по ТУ 20.20.14 -037- 17643541-2022
1	Внешний вид салфеток	Равномерно пропитанные салфетки из белого нетканого материала, упакованные в емкость диспенсер (банки, ведра), в пакеты из полимерных материалов с герметизирующим клапаном, в индивидуальную упаковку «саше» из трехслойного композиционного материала (полиэтилен, фольга, бумага)	п. 5.1
2	Запах	Слабый специфический запах или запах применяемой отдушки	п. 5.1
3	Показатель концентрации водородных ионов (рН) в пропиточном составе	$6,0 \pm 1,0$	п.5.2
4	Массовая доля аликилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (суммарно), %	$0,5 \pm 0,15$	п. 5.3
5	Массовая доля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, %	$0,7 \pm 0,15$	п. 5.4

5	Масса пропиточного раствора на 100 см ² салфетки, г	Для салфеток плотностью >30 г/м ² 2,3 ± 0,5	п. 5.5
6		для салфеток плотностью <30 г/м ² 1,2 ± 0,3	
7	Размер салфеток: длина, ширина, мм	Согласно информации на упаковке	п. 5.6
8	Количество салфеток в потребительской упаковке, шт.	Согласно информации на упаковке	п. 5.7